

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ КНУРІВ-ПРОБНИКІВ



За режиму годівлі один раз на добу:

1. Залишати кнурів на ніч в індивідуальних станках біля поросних свиноматок (окремо від свиноматок після відлучення та ремонтних свинок).
2. Забезпечити відсутність будь-яких контактів із кнуром у свиноматок і ремонтних свинок щонайменше за 30 хвилин до початку виявлення охоти, що дозволить забезпечити хорошу відповідну реакцію на кнура (рефлекс нерухомості).
3. Годівля — перший виробничий захід на початку робочого дня (з одночасним виявленням і лікуванням тих свиноматок, які відмовляються від прийому їжі).
4. Виявлення охоти й осіменіння — відповідно до стандартних регламентів (виявлених в охоті ремонтних свинок варто переводити в індивідуальні станки для осіменіння).
5. Після виявлення охоти кнура можна розташувати в груповому станку біля ремонтних свинок для збільшення тривалості контакту, щоб не витратити на це робочий час операторів. Після закінчення робочого дня перевести кнура у свій індивідуальний станок утримання на ніч.
6. Після закінчення осіменіння кнура також можна залишити в проході перед відлученими свиноматками, що збільшить період стимуляції без додаткових зусиль персоналу. Після закінчення робочого дня перевести кнура у свій індивідуальний станок для утримання на ніч.

Ключовий момент: відсторонити кнура від свиноматок і ремонтних свинок щонайменше за 30 хвилин до початку виявлення охоти.

За можливості залишайте кнурів поруч зі свиноматками та ремонтними свинками у зручний момент для посилення стимуляції.